

longuement
les maladies des
os.

N° 2

observation anatomiques et

patologique sur les chutes ^{qui causent} ~~une luxation de la cuisse dont les auteurs n'ont point traité~~

Il y a quelques jours que je fus appelle

pour voir une dame qui depuis deux

mois quelle estoit tombée, se plaignoit

d'une douleur rhumatismale, occupant

~~à la fois de la chute et de ses alentours~~ la hanche, et toute la cuisse. ^{avec} ~~quelque~~

qui me fut fait de la chute et de sa contusion
~~je ne recommanda de premier coup d'œil et~~

qui la accompagnèrent je me l'anti preneuve même
sans la toucher que la cuisse estoit luxée

en haut, et en dehors; Cependant avant

de luy dire son mal, je l'examinay, et je

luy trouvay tous les signes qui caractérisent

la luxation en haut et en dehors, ^{et} je luy

declaray pour lors que sa cuisse étoit

luxée.

Les assistants blâmerent le chirurgien

ARCH 41 n° 38



qui l'avoit traitée de ce qu'il n'avoit pas
reconnu cette luxation, je fis connoître
qu'on le blamoit à tort, parce qu'il n'avoit
vu l'amalade que les trois ou quatre premiers
jours et que d'ailleurs cette maladie n'est
point connue quoy qu'elle soit très fréquente.
C'est une luxation d'une espèce particulière
que les coups et les chutes ne produisent
point d'abord mais dont ~~elles sont~~ ^{elles sont} causes
occasionnelles, c'est pour ça qu'on étoit trompé.

Lorsque dans une chute le grand
trochanter est frappé, la tête du fémur
est violemment poussée contre les parois
de la cavité de l'ischion, et comme elle
remplit exactement cette cavité, les
cartilages qui la recouvrent, et les ligaments
très grand nombre qui nous d'autre cause
de leur élodication, que cette maladie, ignorée
dans son commencement.

Et et avois réfléchi sur les causes de mon erreur que je voy
re comme est que de l'anne d'abandonner aujour d'hui, afin qu'on
venir le nombre des boiter ne soit pas si grand, car il y en a un

SEMI NA

ronde qui attache ces deux parties l'une à
l'autre, doivent souffrir une violente
contusion. La quelle sera suivie d'obstruction,
d'inflammation, et de deposit. La synovie se
déposera en plus grande quantité, remplira
la capsule, ou tunique ligamenteuse, et
toute la cavité de l'articulation. Ce qui peu
à peu fera suivy de luxation, puisque cette
synovie qui se panche toujours, et même
plus que dans l'état naturel n'est plus
dissipée par les Mouvements de la partie,
elle chassera la tige de l'os avec d'autant
plus de facilité qu'ayant relâché les
Ligamens elle les met hors d'état de résister
non seulement aux efforts qu'elle fait pour
chasser l'os de sa ~~tige~~ Boîte, mais même



à ceut que font les muscles pour la tirer
en haut. L'allongement du Ligament
roud se fait ausy peu à peu: La douleur
augmente, et ne diminue que quand ce
Ligament tout a fait relaché, ou rompu
a abandonné la tête de l'os à toute la
puissance des muscles qui la tirent en
haut;

Ce qui vient d'être dit, montre que
L'os ne se deplace point dans l'instant
de la chute, mais long-tems après & par
degrés. Dans les premiers jours la tête
de l'os garde sa situation Naturelle et
La cuisse ne commence à se raccourcir
que quand la tête a commencé à être
chassée par la finovie: il semble que

La Cuisse ne devoit se raccourcir que
Lors que la tête de l'os est entièrement
sortie; Cependant elle devient plus
courte à mesure que la tête fait son
chemin pour sortir.

La figure sphérique de cette tête en
est la cause; elle va en diminuant depuis
son col jusqu'à son sommet, ou Centre, ce qui
fait que quand la disquer a éloigné la
tête du fémur d'une ligne du fond de sa
cavité, les muscles tirent d'une ligne la
cuisse en haut; et si on mesure la cuisse
de l'endroit, où la tête du fémur touche
le bord supérieur de sa cavité, on la
trouvera plus courte d'une ligne; de



Manière que si cette tête est chassée de
4. ou 5. Lignes, la cuisse se trouvera
plus courte de 4. ou 5. Lignes pour
vu qu'on la mesure de l'endroit où la
tête du fémur touche le bord supérieur
de la cavité, ainsi autant de chemin
que fera la tête du fémur pour sortir,
autant la cuisse perdra de sa longueur,
et quand la tête fera entièrement sortie,
son centre qui dans l'état naturel
répondoit au centre de la cavité, se
trouvera au bord supérieur de cette cavité,
et la cuisse sera plus courte de la moitié
du diamètre de la tête, elle auroit même
été emportée plus loin par l'action des

Muscles sans le ligament rond qui le
retient encore en ce lieu,

Les choses étant dans cette situation
il est facile de concevoir que les douleurs
doivent augmenter. En effet tant que
quelque portion de la tête a pu être
retenue par le rebord de la cavité le
ligament rond a partagé avec luy
l'effort des muscles, et ne s'est allongé que
peu à peu, mais depuis que la tête a
été entièrement chassée, le ligament a
supporté luy seul l'effort des muscles,
Les douleurs sont devenues insupportables
et ont duré jusqu'à ce que la rupture du
ligament ou sa relaxation entière ait



permis aux Muscles de porter l'os ausy
loin que leur contraction à peu leur
permettre, c'est donc à tort que l'on
Blamoit Le Chirurgien de n'avoir pas
trouvé une luxation qui n'est survenue
que longtems apres la chute.

Il faut remarquer que la tête de l'os de
la cuisse ainsi portée en haut et en dehors
peut se tourner en devant ou en arriere.
Lors quelle est tournée en devant le genou
et la pointe du pied se tournent
en dehors, et lors quelle se tourne en
arriere ce qui arrive plus souvent,
on le reconnoit par les signes suivants

~~1.° que la tête du femur est sur le~~

1.^o La tette dufemur en sur la fosse externa delo,
du illes et la cuisse est plus courte.

2.^o Il ya une tumeur sous les muscles
fessiers

3.^o La cuisse le genouil et le pied sont
tournees en dedans.

4.^o La cuisse peut etre portee en dedans
mais non pas en dehors sans de grandes douleurs,

5.^o Le bout du pied appuyé a terre,

6.^o le ploy de la fesse est plus haut,

7.^o il semble qu'il y ait une corde de puis
Le pubis jusqu'au milieu de la cuisse,

Explication

1.^o La cuisse est plus courte parce que
L'os est remonte

2.^o La tumeur ou bosse est causee par
la presence de l'os de place,



3.^o La cuisse le genouil et le pied sont
tournés en dedans parce que les muscles
fessiers sont relâchés et les triceps sont
tendus,

4.^o La cuisse peut être portée en dedans
mais non pas en dehors sans douleur parce
que les muscles triceps sont trop tendus,

5.^o Le bout du pied appuyé à terre
parce que la cuisse étant raccourcie le
malade tâche de la rendre plus longue en
étendant le pied,

6.^o Le ploy de la fesse est plus haut
parce que la cuisse est remontée,

7.^o La corde que l'on sent depuis le
pubis jusqu'à la partie moyenne de la
cuisse vient de ce que les muscles triceps
sont dans une grande tension.

Cette maladie est incurable quand elle
n'est pas fournie. on ne fait point
promptement les remèdes qui conviennent
pour la prévenir jay plusieurs fois
reussy par l'usage des deffensifs faits
avec le blanc de ceuf l'alun en poudre et
l'eau de vie aromatique, ou la moelle
des compressees en huit ou dix doubles
on les applique sur toute l'articulation de
la cuisse ou les retiens par un bandage
contentif et avec que cette même liqueur
on se sans defaire l'appareil en l'humectant
deux ou trois fois par jour,



Il faut situer commodement le malade
dans son lit et qu'il évite tous les mouvements
capable d'exiter la douleur.
il sera saigné deux ou trois fois fois

même plus les jours suivants on repetra
~~deux fois~~ la saignée plus ou moins selon
que la douleur le demandera et que les forces
du malade le pouvant permettre en cette
occasion il ne faut point épargner le sang
si l'on veut éviter l'engorgement des
vaisseaux l'inflammation et le dépôt dans
l'articulation,

Le régime humectant et rafraîchi^{tant}
Le suc épuré des plantes légèrement
amères les anodins et les narcotiques
y font un grand secours



